

NÖ JAGDVERBAND



Die Situation des Niederwildes im Agrarland

29. Österreichische Jägertagung, 04.-05. März 2024


Aigen im Ennstal

Johann Blaimauer, NÖJV


Inhalt

- Streckenentwicklungen
 - Verhältnis Haarraubwild zu Niederwild
- Lebensraumveränderungen
 - Flächenverbrauch
 - Strukturwandel Landwirtschaft
 - Landnutzungsveränderungen
- Zusammenfassung
- Ausblick

Entwicklung Abschusszahlen NÖ 1970 - 2022




Entwicklung Abschusszahlen OÖ 1969 - 2022




Quelle: OÖ Landesjagdverband

Entwicklung Abschusszahlen STMK 1992 - 2022



Quelle: Steirische Landesjägerschaft

Entwicklung Abschusszahlen BGLD 1970 - 2022



Streckenentwicklung 1992-2022


	Feldhase		Fasan		Rebhuhn		Wildente		Fuchs	
	NÖ	Ö	NÖ	Ö	NÖ	Ö	NÖ	Ö	NÖ	Ö
1992	73.085	177.027	73.751	213.377	1.449	8.092	21.031	77.425	9.960	39.240
2002	54.014	162.469	62.679	184.176	3.183	9.978	15.065	73.909	13.776	63.295
2012	63.079	126.120	35.386	103.865	933	7.123	16.190	73.206	24.702	69.946
2022	44.716	101.665	22.380	52.289	799	2.092	7.328	32.166	18.948	60.666
1992/2022	-39%	-42,5%	-70%	-75%	-45%	-75%	-65%	-60%	+90%	+55%

Quelle: NÖJV


Verhältnis Haarraubwild zu Niederwild

Relative Abschussveränderung

Basis 1983 (= 100%)



Bodenverbrauch in ha pro Tag von 2002 bis 2022




Quelle: Österreichische Hagelversicherung

Bodenverbrauch in Österreich nach Bundesländern 2022


Bodenverbrauch in Österreich 2022

Nach Bundesländern, in Hektar pro Tag




Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Umweltbundesamt, WWF Österreich

Entwicklung d. Ø Betriebsgrößen in Ö. von 1951-2020




Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung

Veränderung der landwirtschaftlichen Betriebsgrößenklassen 1995-2020




Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung

Traktoren: Stück vs. PS



Quelle: Statistik Austria / Club Landtechnik Austria. Grafik: Ablinger

Mähdrescher: Stück vs. PS



Quelle: Statistik Austria / Club Landtechnik Austria. Grafik: Ablinger

Zusammenfassung



- Niederwild - Streckenrückgang langfristig stark / flacht in letzten Jahren ab
- Haarraubwild – Strecke steigt während vor allem die Flugwildbesätze sinken - Schere öffnet sich weiter
- Lebensraum „Agrarland“ unter Druck:
 - Flächenverbrauch/Versiegelungsthema
 - Veränderung der Anzahl und Struktur landwirtschaftlicher Betriebe
 - Bewirtschaftete Fläche/Ackerbaubetrieb
 - Veränderung maschinelle Schlagkraft
- Lebensraumverlust qualitativ gestoppt - vorteilhafte ÖPUL-Regelungen
 - 7% Biodiversitätsflächen bis 2027 – darüber hinaus wie lange?
 - 15 Ar Regelung
 - Bewirtschaftungsaufgabe reduziert

Ausblick



„Je weniger Lebensraum, umso höher die Anforderungen an dessen Qualität hinsichtlich Deckung, Äsung, Ruhe und Biodiversität“

Biodiversitätsfördernde Maßnahmen und die umsichtige Kontrolle der Beutegreifer stellen die Basis für eine nachhaltige Nutzung der Niederwildbesätze dar!

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit
Weidmannsheil!



NÖ JAGDVERBAND

